



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI SCIACCA

OGGETTO: richiesta di acquisto Pach Test per l'Amb. di Dermatologia

- **Nome del Farmaco:** PACH TEST;
- **Forma Farmaceutica:** Pannelli di cerotto chirurgico con circa 36 celle, rivestite di un film, contenente la sostanza test, una cella rimane priva di sostanza quindi vuota;
- **Sostanze e Dosaggio** sono: Solfato di Nichel 200 mcq/cm', Alcoli della Lanolina 1000 mcq/cm', Neomicina Solfato 600 mcq/cm', Bicromato di Potassio 54 mcq/cm', Caine Mix 630 mcq/cm', Profumi Mix 430 mcq/cm', Colofonia 1200 mcq/cm', Paraben Mix 1000 mcq/cm', Cella vuota, Balsamo del Perù 800 mcq/cm', Etilendiammina Dicloridrato 50 mcq/cm', Cloruro di Cobalto 20 mcq/cm', Resina-P-Ter-Butilfenolmaldeidica 45 mcq/cm', Resina Epossidica 50 mcq/cm', Carba mix 250 mcq/cm', Gomme mix 75 mcq/cm', Metil(cloro)isotiazolinone 4 mcq/cm', Quaternium-15 100 mcq/cm', Metildibromoglutaronitrile 5.0 mcq/cm', p-fenilendiammina 80 mcq/cm', Formaldeide 180 mcq/cm', Mercapto mix 75 mcq/cm', Timerosal 7 mcq/cm', Tiurami mix 27 mcq/cm', Diazolidinil Urea 550 mcq/cm', Chinoline mix 190 mcq/cm', Tixocortolo-21-pivalato 3.0 mcq/cm', Oro Tiosolfato di Sodio 75 mcq/cm', Imidazolidinil Urea 600 mcq/cm', Budesonide 1.0 mcq/cm', Idrocortisone-17-Butirrato 20 mcq/cm', Mercaptobenzotiazolo 75 mcq/cm', Bacitracina 600 mcq/cm', Partenolide 3.0 mcq/cm', Disperso Blu 106 50 mcq/cm', 2-Bromo-2-Nitropropano 1.3-Diol (Bronopol) 250 mcq/cm';
- **Norme di qualità e Sicurezza** per i Pach Test prevedono: una preparazione attenta del paziente e una gestione adeguata durante l'esecuzione e la lettura dei risultati, è importante evitare la somministrazione di cortisonici o antistaminici nei giorni precedenti al test, mantenere la zona di applicazione asciutta e pulita. La lettura dei risultati avviene alle 48-72 ore dall'applicazione, dallo Specialista Ambulatoriale di Dermatologia Allergologica che ha in carico l'utenza. Il Patch Test è un esame indolore che non presenta rischi o effetti collaterali particolari, i più comuni sono rappresentati da gonfiore, rossore e prurito che può svilupparsi alcune ore dopo il test e persistere per un paio di giorni fino alla loro spontanea scomparsa, nei casi più gravi può essere trattata con corticosteroidi per via topica. In rari casi può essere necessario il trattamento con corticosteroidi per via sistemica.
- **Quantità necessaria:** il consumo di tali test è di 100 UNITA' annuali.

